



DECÁLOGO DE LAS DIARREAS NEONATALES

1. **EVITAR DIARREAS VACUNANDO** a las madres frente a Rotavirus, coronavirus y E.coli F5
2. **VACUNAR**, preferentemente, **en el momento del SECADO** (aunque podemos vacunar entre 3 meses y 3 semanas antes del parto)
3. **CONTROLAR LA CALIDAD DEL CALOSTRO** (refractómetro)
4. **ENCALOSTRAR** los terneros **SIEMPRE ANTES** de 6 horas postparto
5. **ADMINISTRAR**, mínimo 3 litros de calostro en 2 tomas
6. **LIMPIAR CUBOS y TETINAS** (el calostro debe ser lo más higiénico posible)
7. **ALOJAR** a los terneros en instalaciones **LIMPIAS** y adecuadas (evitar corrientes de aire)
8. **MANTENER** los animales bien hidratados
9. **SEPARAR** los animales enfermos
10. **CONSULTAR CON EL VETERINARIO** en caso de diarrea (determinará el patógeno responsable y establecerá el tratamiento más adecuado)

“Un tratamiento inadecuado puede incrementar la resistencia a los antibióticos”

Con estos sencillos pasos podemos:

- **Mejorar el índice de conversión de los animales** (crecerán MAS y MEJOR)
- **Disminuir el gasto en medicamentos**
- **Reducir la mortalidad**
- **Mejorar la reproducción en la futura cría**
- **Disminuir el coste en mano de obra**